



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
 जे.न. कृ. वि. वि. आंचलिक कृषि अनुसन्धान
 जबलपुर, मध्य प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-09-2024

जबलपुर(मध्य प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-09-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-09-07	2024-09-08	2024-09-09	2024-09-10	2024-09-11
वर्षा (मिमी)	72.0	27.0	26.0	18.0	29.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.5	31.9	32.2	32.4	31.9
न्यूनतम तापमान(से.)	25.1	23.5	22.0	22.2	22.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	97	90	89	85
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	69	65	64	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	13	13	14
पवन दिशा (डिग्री)	270	283	270	257	257
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	8

मौसम सारांश / चेतावनी:

*भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भोपाल से प्राप्त पूर्वानुमान के आधार पर, अगले पांच दिनों में मध्यम से हल्की भारी वर्षा होने की और बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 9-14 किमी / घंटा चलने की संभावना है

सामान्य सलाहकार:

*सब्जियों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए मैलाथियान का 1.5- 2 मिली लीटर का छिड़काव करें। स्प्रे शाम के समय किया जाना चाहिए। • खेत से अधिक पानी की निकासी के लिए जल निकासी चैनल तैयार करें। • सोयाबीन के खेतों में सफेद मक्खी दिखाई देने पर। निकटतम KVK के वैज्ञानिक से परामर्श के बाद कीटनाशक का प्रयोग करें। • खेतों से अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जल निकासी चैनलों का निर्माण करें। • लगातार फसल की निगरानी करें। पीले मोज़ेक पौधों को उखाड़ें और नष्ट करें। खेत में पीले रंग का चिपचिपा जाल लगा

लघु संदेश सलाहकार:

अगले पांच दिनों में मध्यम से हल्की भारी बारिश होने की संभावना है उचित मिट्टी और जल संरक्षण करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	दूसरी खुराक 30 किलोग्राम यूरिया 30 से 35 दिन बाद तथा तीसरी खुराक 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर 40 से 45 दिन बाद डालें। धान में उपयुक्त खरपतवारनाशकों का प्रयोग नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से परामर्श के बाद करें। अगेती धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण हेतु 2 मिली लीटर क्लोरोप्यरीफोस प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें या 50 एस पी कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।
सोयाबीन	सोयाबीन की फसल , अधिक पानी की बजह से फसल में बधवार कम हो रही है। सोयाबीन के खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें और 3 किलो ग्राम सल्फर 80 प्रतिसेत कीडब्लूडीजी सेवई वाला प्रति एकड़ छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीट दिखाई देने पर 100 ग्राम 25% थियामेथोक्सम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 100 मि.ली को 150 मिलीलीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें।